

Les jeunes de 11 à 13 ans n'auront besoin que de deux injections car leur immunité est meilleure.

Il est important de respecter les schémas vaccinaux suivants :

1^{er} schéma vaccinal

	Gardasil 9[®]	Gardasil[®]	Cervarix[®]
1 ^{ère} injection	Entre 11 et 14 ans	Entre 11 et 13 ans	Entre 11 et 14 ans
2 ^{ème} injection	6 – 13 mois plus tard	6 mois plus tard	6 mois plus tard

2nd schéma vaccinal : pour les jeunes filles plus âgées

	Gardasil 9[®]	Gardasil[®]	Cervarix[®]
1 ^{ère} injection	Entre 15 et 19 ans	Entre 14 et 19 ans	Entre 15 et 19 ans
2 ^{ème} injection	2 mois après le 1 ^{er} injection	2 mois après la 1 ^{ère} injection	1 mois après la 1 ^{ère} injection
3 ^{ème} injection	4 mois après la 2 ^{ème} injection	4 mois après la 2 ^{ème} injection	5 mois après la 2 ^{ème} injection

Plus d'information : <http://www.eve.asso.fr/la-vaccination>

Pour toute demande de remboursement, veuillez compléter et renvoyer ce formulaire par courrier ou courriel (fichier .pdf) au Comité du Bas-Rhin de la Ligue Contre le Cancer.

LIGUE CONTRE LE CANCER
21 rue des Francs-Bourgeois
67000 Strasbourg
Standard : 03 88 24 17 60
Mail : cd67@ligue-cancer.net